

Paludisme




L'Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)
Comores 2012

- **Disponibilité et utilisation des moustiquaires**
- Traitement préventif des femmes enceintes
- Traitement des enfants

Disponibilité de moustiquaires selon la résidence

Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire


■ Comores ■ Urbain ■ Rural



MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide
MILDA: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action


MII dans la sous-région

Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)




Disponibilité de moustiquaires par niveau socio-économique

Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)




Disponibilité des MII par île



Ngazidja
67 %

Comores
59 %



Ndzuwani
51 %



Mwali
64 %

*Pourcentage de
ménages avec au
moins une MII*

Maoré
(non enquêtée)



MI: Moustiquaire Imprégnée
d'Insecticide


Accès à une MII

41 % de la population de fait des ménages **ont accès à une MII**, c'est-à-dire qu'elle pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.


Utilisation des moustiquaires par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête

Dans tous les ménages




Dans les ménages avec au moins une MII



MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide

Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques


Pourcentage de ménages dont les murs intérieurs du logement ont été pulvérisés au cours des 12 derniers mois



- Disponibilité et utilisation des moustiquaires
- **Traitement préventif des femmes enceintes**
- Traitement des enfants

Traitement Préventif Intermittent

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête




- Disponibilité et utilisation des moustiquaires
- Traitement préventif des femmes enceintes
- **Traitement des enfants**

Traitement des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans

Parmi les enfants ayant eu de la fièvre



* CTA: combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

Antipaludiques pour le traitement des enfants

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'enquête et qui ont pris des antipaludiques :

46 % ont pris SP/Fansidar

21 % ont pris de la Chloroquine

18 % ont pris de la Quinine

16 % ont pris de CTA

11 % ont pris un autre antipaludique

3 % ont pris de la Amodiaquine

Principaux résultats

- **59 %** des ménages possèdent une **Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)**
- **41 %** de la population de fait des ménages **ont accès à une MII**
- **41 %** des enfants de moins de cinq ans et **44 %** des femmes enceintes de 15-49 ans **ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête**
- **28 %** des femmes enceintes ont pris **deux doses ou plus** de la **SP/Fansidar, au moins une au cours d'une visite prénatale**
- Pour **28 %** d'enfants ayant eu de la fièvre, on a prélevé du sang pour être testé