

Mortalité des enfants et mortalité adulte et maternelle



L'Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)
Comores 2012

Mortalité des enfants de moins de cinq ans

- Niveaux et tendances
- Mortalité différentielle et groupes à hauts risques

Mortalité adulte et mortalité maternelle

Mortalité des enfants

- **Mortalité néonatale:**

Probabilité de décéder avant d'atteindre un mois exact

- **Mortalité post-néonatale:**

Pour les enfants âgés d'un mois exact, probabilité de décéder avant d'atteindre l'âge de 12 mois

- **Mortalité infantile:**

Probabilité de décéder avant d'atteindre le 1^{er} anniversaire

- **Mortalité juvénile:**


Chez les enfants âgés d'un an exact, la probabilité de décéder avant le 5^{ème} anniversaire

- **Mortalité infanto juvénile:**

Probabilité de décéder entre la naissance et le 5^{ème} anniversaire

Mortalité avant l'âge de 5 ans

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête




Tendances de la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête


■ EDSC-I 1996

■ EDCS-MICS II 2012



Mortalité infanto-juvénile dans la sous-région

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête




Mortalité des enfants de moins de
cinq ans


- **Niveaux et tendances**
- **Mortalité différentielle et
groupes à hauts risques**

Mortalité adulte et mortalité
maternelle

Mortalité infanto-juvénile par île



Ngazidja
57



Ndzuwani
45




Mwali
41

*Décès pour 1 000 naissances
vivantes pour la période des 10
années ayant précédé l'enquête*

Maoré
(non enquêtée)



Mortalité des enfants par niveau d'instruction de la mère




*Décès pour 1 000 naissances
vivantes pour la période des 10
années ayant précédé l'enquête*

Mortalité des enfants par quintile de bien-être économique

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête

■ Mortalité infantile ■ Mortalité infanto-juvénile



Facteurs qui contribuent à une augmentation du risque de mortalité des enfants


Les enfants courent un risque élevé de décéder si:

- La mère est “trop jeune” (moins de 18 ans) ou “trop âgée” (plus de 34 ans)
- Le rang de naissance est élevé: La mère a quatre enfants ou plus
- L'intervalle entre naissances est trop court: moins de 24 mois avec la naissance précédente

Mortalité des enfants par rang de naissance


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête

■ Mortalité infantile ■ Mortalité infanto-juvénile




Mortalité des enfants par âge de la mère à la naissance

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



Mortalité des enfants par longueur de l'intervalle entre naissances

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



Mortalité des enfants de moins de cinq ans

- Niveaux et tendances
- Mortalité différentielle et groupes à hauts risques

Mortalité adulte et mortalité maternelle

Mortalité adulte

Mortalité des adultes de 15-49 ans pour la période 0-6 ans avant l'enquête:

1,6 décès pour 1 000 pour les **femmes**

1,6 décès pour 1 000 pour les **hommes**

Mortalité maternelle

Ces femmes sont décédées :

- lors de la grossesse,
- durant l'accouchement, ou
- dans les 2 mois qui ont suivi la fin de la grossesse ou l'accouchement

Mortalité maternelle

Le taux de mortalité maternelle pour la période 0-6 ans avant l'enquête:

172 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes

(L'intervalle de confiance de 95 % pour le taux de mortalité maternelle varie de 60 à 284 décès pour 100 000 naissances vivantes.)

Principaux résultats

- **Sur 1000 enfants à la naissance, 50** décèdent avant d'atteindre l'âge de 5 ans.
- C'est parmi les enfants de la région **de Ngazidja** et parmi ceux qui sont nés **moins de deux ans** après leur frère ou sœur que le taux de mortalité infanto-juvénile est **le plus élevé**.
- Le taux de mortalité maternelle est estimé à **172** décès pour 100 000 naissances vivantes.